

2736 - EVOL 6X400ML

FÓRMULA:

Cada frasco de 100 mL contém:

Ivermectina.....0,80 g
Sulfóxido de Albendazol.....10,0 mL
Veículo q.s.p.....100,00 mL

INDICAÇÕES PRINCIPAIS:

A Ivermectina é um derivado semissintético das avermectinas, que são um grupo de lactonas macrocíclicas quimicamente relacionadas e que são produzidas pela fermentação do fungo *Streptomyces avermitilis*. Esta molécula é altamente ativa contra um grande número de espécies de nematódeos pulmonares e gastrintestinais, bem como sarnas, carrapatos, moscas e larvas de dípteros. O Sulfóxido de Albendazol, um fármaco da classe dos benzimidazóis, é indicado para tratamento de doenças causadas por parasitas gastrintestinais, tanto em suas formas larvais quanto adultas. Atua em nematódeos, cestódeos e alguns protozoários, sendo também eficaz em parasitoses hepáticas e pulmonares.

O produto **evol** é um endectocida de amplo espectro para bovinos, indicado para o tratamento e controle dos nematódeos gastrintestinais *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*, tratamento e controle de infecções por *Dermatobia hominis* (berne) e pelo carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

MODO DE USO E DOSAGENS:

Agitar o produto antes de usar.

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 01(um) mL para cada 40 kg de peso corporal, conforme quadro abaixo:

PESO	DOSAGEM de evol (mL)
40 kg	1 mL
100 kg	2,5 mL
200 kg	5 mL
300 kg	7,5 mL
400 kg	10 mL
500 kg	12,5 mL
1 mL a cada 40 kg	

Dosagem equivalente a 0,2 mg de Ivermectina e 2,5 mg de Sulfóxido de Albendazol por quilograma de peso vivo.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

Não administrar o produto pelas vias intravenosa ou intramuscular. Não aplicar em fêmeas prenhes. Estudos clínicos realizados com o **evol** em bovinos com idade superior a 02 meses mostram que o produto é seguro e quando utilizado de acordo com as recomendação do fabricante.

PRECAUÇÕES:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente.

Após aberto o produto deve ser utilizado em até 04 meses.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA.

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 22 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

REAÇÕES ADVERSAS:

Não são esperadas reações adversas com o uso do **evol** dentro da posologia recomendada, entretanto reações de sensibilidade individuais podem eventualmente ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Pode ocorrer edema transitório e a formação de pequeno nódulo no local da administração, geralmente sem necessidade de tratamento.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais doméstico.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 400mL.